



concile

Übersicht aller quantitativen Schnelltests für unsere Point-of-Care Messgeräte

concile[®] α1 Reader concile[®] Ω100 Reader Der Kompakte und der Vielseitige



Test	Indikationen	Probe	Probenvolumen	Inkubation (min)	Messbereich
Cortisol (auch concile [®] α1)	Stress, Überprüfung Cortisol-Spiegel	Vollblut, Serum	1. 10 µl Vollblut oder 5 µl Serum in Puffer im UniSampler mischen. 2. 3 Tropfen verdünnte Probe in Testkassette	15	30–1.000 ng/ml
CRP (auch concile [®] α1)	Infektionen, Entzündungen	Vollblut, Plasma, Serum	1. 10 µl Plasma oder Serum bzw. 20 µl Vollblut in Verdünnungspuffer 2. 90 µl (3 Tropfen) verdünnte Probe in Testkassette	15	0,5–100 mg/l
Ferritin¹ (auch concile [®] α1)	Eisenmangelanämie	Vollblut, Serum	1. 20 µl Vollblut oder 10 µl Serum in Puffer im UniSampler mischen. 2. 3 Tropfen verdünnte Probe in Testkassette	15	0,3–450 ng/ml
HPV High Risk (auch concile [®] α1)	HPV-bedingte Tumore	Serum	25 µl Serum in HPV-Reagenz mischen und 5 Minuten inkubieren. 2. Gesamte gemischte Probe in Testkassette geben	15	250–15.000 ng/ml (Lot-abhängig)
NAb (auch concile [®] α1)	COVID-19 Immunität	Vollblut, Plasma, Serum	1. 10 µl Vollblut oder 5 µl Serum in Puffer im UniSampler mischen. 2. 3 Tropfen verdünnte Probe in Testkassette	15	15–3.000 BAU/ml (Lot-abhängig)
NeoPT	Virusinfektionen	EDTA-Plasma	100 µl	20	2,5–100 nmol/l (ng/ml x 3,95 = nmol/l)
PCT	Bakterielle Infektionen	Vollblut, Plasma, Serum (kein EDTA)	100 µl Plasma oder Serum bzw. 120 µl Vollblut	15	0,1–10 ng/ml
PSA	Prostata Ca	Plasma, Serum	100 µl	20	0,5–10 ng/ml
fPSA	Prostata Ca	Plasma, Serum	100 µl	20	0,5–10 ng/ml
sPLA2-IIA	Kardiovaskuläres Risiko	EDTA-Plasma	1. 25 µl EDTA-Plasma in Testkassette 2. 4 Tropfen Puffer zufügen	10	20–500 ng/ml
Testosteron (auch concile [®] α1)	Überprüfung Testosteron-Spiegel	Vollblut, Serum	1. 10 µl Vollblut oder 5 µl Serum in Puffer im UniSampler mischen. 2. 3 Tropfen verdünnte Probe in Testkassette	15	1,5–25 ng/ml (ng/ml x 3,467 = nmol/l)
TSH	Schilddrüsen-Diagnostik	Serum, Plasma	100 µl	20	0,3–40 mIU/l
UBC[®] Rapid (auch concile [®] α1)	Harnblasen Ca	Urin	1. Urin bis 1 ml-Marke in Verdünnungspuffer auffüllen 2. 75 µl (3 Tropfen) verdünnte Probe in Testkassette	10	5–300 µg/l
Vitamin D (auch concile [®] α1)	Vitamin D Mangel	Vollblut, Serum	1. 10 µl Vollblut oder 5 µl Serum in Puffer im UniSampler mischen. 2. 3 Tropfen verdünnte Probe in Testkassette	15	10–100 ng/ml (ng/ml x 2,496 = nmol/l)

GP Reader NT

Das Testsystem für Magengesundheit



GastroPanel [®] Quick Test NT	Indikationen	Probe	Probenvolumen	Inkubation (min)	Messbereich
H. pylori (qualitativ)	Dyspeptische Symptome, atrophische Gastritis, H. pylori Infektion	EDTA-Plasma, Vollblut	1. 80 µl Probe (EDTA-Plasma oder Vollblut) in 320 µl Puffer geben und mischen 2. 80 µl verdünnte Probe in jede der vier Probenvertiefungen der Testkassette geben	15	Interpretation durch Algorithmus der Reader-Software
Pepsinogen I					
Pepsinogen II					
Gastrin-17					

Abrechnungsbeispiele für patientennahe Diagnostik mit concile²

Messgerät / Test	Indikationen	Vorschlag GOÄ	Erstattung (Faktor 1,15)	Einkaufspreis inkl. MwSt.	Differenz
concile® Q100 / concile® α1					
Cortisol (auch concile® α1)	Stress, Überprüfung Cortisol-Spiegel	4020	16,76 €	10,00 €	6,76 €
CRP (auch concile® α1)	Infektionen, Entzündungen	3741	13,41 €	8,33 €	5,08 €
Ferritin ¹ (auch concile® α1)	Eisenmangelanämie	3742	16,76 €	9,52 €	7,24 €
fPSA	Prostata Ca	3908 H3	20,11 €	7,74 €	12,37 €
HPV High Risk ³ (auch concile® α1)	HPV-bedingte Tumore	4405	53,62 €	29,75 €	23,87 €
NAb (auch concile® α1)	COVID-19 Immunität (neutralisierende Antikörper)	4405	53,63 €	17,85 €	35,78 €
NeoPT ^{3,4}	Virusinfektionen	4069	50,28 €	23,80 €	26,48 €
PCT ^{3,4}	Bakterielle Infektionen	4069	50,28 €	23,21 €	27,07 €
PSA	Prostata Ca	3908 H3	20,11 €	6,55 €	13,56 €
sPLA2-IIA ³	Kardiovaskuläres Risiko	4069	50,28 €	29,75 €	20,53 €
Testosteron ⁴ (auch concile® α1)	Überprüfung Testosteron-Spiegel	4042	23,46 €	15,23 €	8,23 €
TSH	Schilddrüsen-Diagnostik	4030	16,76 €	8,93 €	7,83 €
UBC® Rapid ³ (auch concile® α1)	Harnblasen Ca	3911 H3	30,16 €	21,42 €	8,74 €
Vitamin D ⁴ (auch concile® α1)	Vitamin D Mangel	4138	32,18 €	18,56 €	13,62 €

GP Reader / GastroPanel® Quick Test					
H. pylori (qualitativ) ³	Dyspeptische Symptome, atrophische Gastritis, H. pylori Infektion	4291	23,46 €	65,45 €	54,55 €
Pepsinogen I ^{3,4}		4062	32,18 €		
Pepsinogen II ^{3,4}		4062	32,18 €		
Gastrin-17 ⁴		4051	32,18 €		

Qualitative Tests: Kein Messgerät erforderlich					
Celiac Quick Test ³	Zöliakie	3877	30,16 €	19,04 €	11,12 €
FluAB-C19 ³	Influenza A/B und COVID-19	4648 ² + 4644	33,52 €	17,85 €	15,67 €
NowCheck COVID-19 Ag Antigentest ³	COVID-19	4648	16,76 €	3,51 €	13,25 €
ScheBo® 2in1 Quick ³	Kolorektales Ca	3911 H3 + 3747	42,23 €	23,68 €	18,55 €
ScheBo® M2-PK Quick ³	Kolorektales Ca	3911 H3	30,16 €	21,00 €	9,16 €
UBC® Rapid visual ³	Harnblasen Ca	3911 H3	30,16 €	15,47 €	14,69 €
Urin System Chrom ³	Rezidivierende Harnwegsinfekte	9 x 4546 + 8 x 4611	88,53 €	31,24 €	57,29 €

1 Pipeline **2** Unverbindliche Empfehlung. Ggf. Leistung begründen: Bei Verdacht auf / Ausschluss von / Verlaufskontrolle. § 4 Abs. 2 Satz 1 der GOÄ beachten: Der Arzt kann Gebühren nur für selbständige ärztliche Leistungen berechnen, die er selbst erbracht hat oder die unter seiner Aufsicht nach fachlicher Weisung erbracht wurden (eigene Leistungen). Für die mit H3 gekennzeichneten Untersuchungen ist der Höchstwert nach der Nummer 3631.H zu beachten: € 93,84 (Faktor 1,15).

3 Analogziffer: GOÄ § 6 Abs. 2: „Selbständige ärztliche Leistungen, die in das Gebührenverzeichnis nicht aufgenommen sind, können entsprechend einer nach Art, Kosten- und Zeitaufwand gleichwertigen Leistung des Gebührenverzeichnisses berechnet werden.“

4 Wird eine Untersuchung mittels Ligandenassay, die obligatorisch eine Doppelbestimmung beinhaltet, als Einfachbestimmung durchgeführt, so dürfen nur zwei Drittel der Gebühr berechnet werden.



Vertrieb:
concile GmbH
Kronenmattenstr. 6
D-79100 Freiburg, Germany

T +49 761 151474-10
F +49 761 151474-19
contact@concile.de
www.concile.de



M_BRS_INF_a1_o100_GPL_0723